

INFORME-SE SOBRE OS LOCAIS DE TRATAMENTO DA HANSENÍASE

GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE (GERES)

I GERES (Recife)	(81) 3231-7828
II GERES (Limoeiro)	(81) 3628-0108
III GERES (Palmares)	(81) 3662-1035
IV GERES (Caruaru)	(81) 3722-4311
V GERES (Garanhuns)	(87) 3761-2364
VI GERES (Arcoverde)	(87) 3821-0857
VII GERES (Salgueiro)	(87) 3871-0011
VIII GERES (Petrolina)	(87) 3862-1661
IX GERES (Ouricuri)	(87) 3874-1324
X GERES (Afog. Ingazeira)	(87) 3838-1556

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

GERÊNCIA DE ATENÇÃO A HANSENÍASE,
TUBERCULOSE, DST/AIDS E HEPATITE

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE
CONTROLE DA HANSENÍASE - PE

END: Praça Oswaldo Cruz S/N Boa Vista Recife - PE

CEP: 50.050-210

FONE: (81) 3412.6345 - FONE/FAX: (81) 3412-6253



PERNAMBUCO

NA LUTA CONTRA A HANSENÍASE

49

HANSENÍASE

É uma doença causada por um bacilo chamado "Mycobacterium leprae", conhecido como bacilo de Hansen, que afeta principalmente a pele e os nervos da face, braços, mãos, pernas e pés, podendo causar incapacidades e deformidades físicas.

SINAIS E SINTOMAS

• Inicialmente, aparecem uma ou mais manchas de cor avermelhada ou esbranquiçada, na pele, em qualquer parte do corpo. No local, ocorre diminuição ou perda da sensibilidade ao calor, a dor e ao tato. Na maioria das vezes ela passa despercebida por não incomodar, pois não coça e nem dói.



- Com a evolução da doença, surge sensação de picadas, dormência ou formigamento em partes do corpo afetadas.
- Sensação de fraqueza nos braços, mãos, pernas e pés.
- Caroços ou inchações nos cotovelos, nas mãos, no rosto e nas orelhas.



TRANSMISSÃO


Nem toda pessoa que tem hanseníase transmite a doença. Apenas aquela que tem a forma transmissível, e **não está em tratamento**, pode passar a doença para outra pessoa através da tosse, espirro e fala, num convívio diário, por muito tempo.

TRATAMENTO


Sim. O tratamento é composto por medicamentos fornecidos gratuitamente pelos serviços de saúde.

Tem duração de 6 meses para as formas não contagiosas, e 12 ou até 24 meses para as formas contagiosas.


A tomada correta dos medicamentos previne a evolução da doença, garantindo a cura.




Blister (MB) - Adultos



Blister (MB) - Infantil



Blister (PB) - Adultos




Blister (PB) - Infantil

COMPLICAÇÕES

Quando os nervos da face, braços e pernas ficam comprometidos, surgem as incapacidades físicas e deformidades como:

- Diminuição da força muscular
- Dificuldade de realizar movimentos
- Diminuição ou perda total de sensibilidade nas áreas afetadas, favorecendo o surgimento de ferimentos
- Atrofias e deformidades das mãos, pés
- Comprometimento da visão


Quanto mais cedo for descoberto um caso de hanseníase e iniciado o tratamento, menor o risco de comprometimento dos nervos, evitando a instalação de complicações.



FIQUE SABENDO :

- As pessoas com maior possibilidade de adoecer são aquelas que moram na mesma casa de um doente sem tratamento;
- Numa casa que tem uma pessoa doente, todas as outras devem ir a um serviço de saúde para serem examinadas, mesmo que não apresentem manchas na pele
- A pessoa doente de hanseníase não precisa ser isolada do seu convívio social
- Mesmo o doente que tem a forma contagiosa da doença, após 15 dias de tratamento já não transmite mais
- O tratamento não deve ser interrompido. Caso ocorra qualquer anormalidade, deve-se procurar imediatamente o serviço de saúde;
- **A Hanseníase tem cura.**

Antes do tratamento



Depois do tratamento



Procure o posto de Saúde mais próximo de sua casa ou o agente comunitário de saúde da sua área de residência.

