

# **RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE DE HANSENÍASE**

**Leia com atenção esse folheto pois ele vai ajudá-lo a evitar as complicações da doença e do uso dos medicamentos:**

1. Procure vir ao posto no dia marcado evitando assim ficar sem os medicamentos. Quanto mais correto o tratamento, melhores resultados.
2. Observe os medicamentos que você vai receber e veja se você não tem dúvidas sobre eles. Se tiver, pergunte para os responsáveis.
3. Trazer a família para um exame e a BCG é tão importante quanto seu tratamento.
4. Se você apresentar as reações abaixo, procure o posto de saúde ou pare com os medicamentos até conseguir vir ao posto:
  - pontas dos dedos e lábios roxos
  - batedeira, falta de ar, fôlego curto
  - dor de cabeça
  - vômitos, febre, diarreia após tomar a dose mensal
  - vermelhidão nos braços e rosto

5. Durante o tratamento, pode ocorrer de suas manchas aumentarem em número e tamanho. Caso aconteça, não pare os remédios. Procure o posto de saúde que você receberá a orientação necessária.
6. Caso você tenha dores nas juntas, inchaço nas mãos e pés, fraqueza de músculos ou caroços vermelhos com febre no corpo; procure ir imediatamente ao posto de saúde.
7. Não há necessidade de dieta ou mudança de qualquer atividade por causa do tratamento.
8. Se você começou a usar prednisona, há necessidade que ao retornar diga à menina que fornece os medicamentos, pois você não pode interromper de repente esse remédio.
9. Se precisar fazer fisioterapia, procure seguir corretamente as orientações recebidas pois elas são importantes para evitar que seus problemas piorem.
10. Se você usa Talidomida, não se esqueça que mulheres na idade fértil não podem usá-la.
11. Deixe seus remédios longe do alcance das crianças e evita usá-los com outras pessoas.

**QUALQUER DÚVIDA, PROCURE O POSTO  
DE SAÚDE PARA ORIENTAÇÕES**

Secretaria de Estado de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde

Apoio: DAHW