

Sinais e sintomas

- Manchas dormentes na pele.
- Áreas da pele com dormência, com ou sem manchas.
- Dormência nos pés e nas mãos.
- Caroços e "inchaços" no rosto e nas orelhas.
- Diminuição de força nas mãos e nos pés.



Diagnóstico

É clínico, por meio do exame dermatoneurológico.

Classificação

A classificação operacional do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas:

PAUCIBACILAR (PB) – casos com até cinco lesões de pele.

MULTIBACILAR (MB) – casos com mais de cinco lesões de pele.

Tratamento PQT/OMS

O tratamento é ambulatorial utilizando os esquemas terapêuticos padronizados, de acordo com a classificação operacional.

PAUCIBACILAR: 6 cartelas

Adulto	Rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com administração supervisionada.
	Dapsona: uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária de 100 mg auto-administrada.

Infantil	Rifampicina: uma dose mensal de 450 mg (1 cápsula de 150 mg e 1 cápsula de 300 mg) com administração supervisionada.
	Dapsona: uma dose mensal de 50 mg supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.

MULTIBACILAR: 12 cartelas

Adulto	Rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com administração supervisionada.
	Dapsona: uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária de 100 mg auto-administrada.
	Clofazimina: uma dose mensal de 300 mg (3 cápsulas de 100 mg) com administração supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.

Infantil	Rifampicina: uma dose mensal de 450 mg (1 cápsula de 150 mg e 1 cápsula de 300 mg) com administração supervisionada.
	Dapsona: uma dose mensal de 50 mg supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.
	Clofazimina: uma dose mensal de 150 mg (3 cápsulas de 50 mg) com administração supervisionada e uma dose de 50 mg auto-administrada em dias alternados.

Critérios de alta por cura



Infantil




Adulto

· PB: **6** doses supervisionadas (6 cartelas) em até **9** meses.



Infantil



Adulto

· MB: **12** doses supervisionadas (12 cartelas) em até **18** meses.

Diagnóstico de reações hansênicas

São alterações do sistema imunológico que se exteriorizam com manifestações inflamatórias agudas e subagudas que podem ocorrer tanto nos casos PB como MB, antes, durante ou depois do tratamento com PQT.

São consideradas urgências e encaminhadas às unidades de maior complexidade para tratamento nas primeiras 24 horas. Nas situações onde há dificuldade de encaminhamento imediato, os seguintes procedimentos deverão ser aplicados até a avaliação pela unidade de referência:

- orientar para repouso do membro afetado.
- iniciar prednisona na dose de 1 mg/kg peso/dia.

Vigilância epidemiológica

É uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória. Todos os contatos intradomiciliares devem ser submetidos a exame dermatoneurológico. Recomenda-se ainda aplicação de duas doses da vacina BCG-ID com intervalo mínimo de seis meses.

Um toque de saúde:
hanseníase
tem cura.