

Hanseníase é uma doença séria. Mas é só tratar que cura.

SINAIS E SINTOMAS

- Manchas dormentes na pele.
- Áreas da pele com dormência.
- Dormência persistente nos pés e nas mãos.
- Caroços no corpo que não coçam.
- Redução da força nas mãos e nos pés.



DIAGNÓSTICO

É clínico, por meio do exame dermatoneurológico e da baciloscopia cutânea.

CLASSIFICAÇÃO

A classificação operacional do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas e na baciloscopia cutânea realizada.

PAUCIBACILAR (PB) – casos com até cinco lesões na pele.

MULTIBACILAR (MB) – casos com mais de cinco lesões na pele.

TRATAMENTO PQT/OMS

O tratamento é ambulatorial, utilizando os esquemas terapêuticos padronizados pelo PNCH/MS/OMS, de acordo com a classificação operacional, com administração de dose mensal supervisionada pela equipe do Posto de Saúde.

PAUCIBACILAR: 6 cartelas

Adulto
Rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com administração supervisionada.
Dapsona: uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária de 100 mg auto-administrada.

Infantil
Rifampicina: uma dose mensal de 450 mg (1 cápsula de 150 mg e 1 cápsula de 300 mg) com administração supervisionada.
Dapsona: uma dose mensal de 50 mg supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.

MULTIBACILAR: 12 cartelas

Adulto
Rifampicina: uma dose mensal de 600 mg (2 cápsulas de 300 mg) com administração supervisionada.
Dapsona: uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária de 100 mg auto-administrada.
Clofazimina: uma dose mensal de 300 mg (3 cápsulas de 100 mg) com administração supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.

Infantil
Rifampicina: uma dose mensal de 450 mg (1 cápsula de 150 mg e 1 cápsula de 300 mg) com administração supervisionada.
Dapsona: uma dose mensal de 50 mg supervisionada e uma dose diária de 50 mg auto-administrada.
Clofazimina: uma dose mensal de 150 mg (3 cápsulas de 50 mg) com administração supervisionada e uma dose de 50 mg auto-administrada em dias alternados.

CRITÉRIOS DE ALTA POR CURA



Infantil




Adulto

PB
6 doses supervisionadas (6 cartelas) em até 9 meses.



Infantil



Adulto

MB
12 doses supervisionadas (12 cartelas) em até 18 meses.

DIAGNÓSTICO DE REAÇÕES HANSÊNICAS

São alterações do sistema imunológico que se exteriorizam com manifestações inflamatórias agudas ou subagudas que podem ocorrer nos casos PB como MB, antes, durante ou depois do tratamento com PQT.

São consideradas urgências e devem ser encaminhadas às unidades de maior complexidade para tratamento nas primeiras 24 horas. Nas situações onde há dificuldade de encaminhamento imediato, os seguintes procedimentos deverão ser aplicados até a avaliação pela unidade de referência:

- Orientar para repouso do membro afetado.
- Iniciar prednisona na dose de 1 mg/kg peso/dia.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

É uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Todos os contatos intradomiciliares devem ser submetidos a exame dermatoneurológico e, caso não apresentem a doença, recomenda-se a aplicação de BCG, desde que não haja contra-indicação.

- Sem cicatriz de BCG = 1 dose.
- Com cicatriz anterior de BCG = 1 dose.
- Com duas cicatrizes = não vacinar.

Sebastião Pamplona
Servidor Público
Fundador MORHAN
Piraquara - Paraná

Eu tive
HANSENÍASE.
Fiz o tratamento
e estou curado.



TELEHANSEN 0800 26 2001